



CAPITOLUL VII

DESCRIEREA PARCELARĂ



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform lung	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	FÂNAȘTE	-	151	Pășune		
ALTITUDINE: 426 m EXPOZIȚIE: - SE ÎNCLINAȚIE: 25% SOL: regosol calcaric cu al.stab						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Agrostis tenuis, Festuca valesiaca, Briza media, Holcus lanatus, Bromus erectus, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus - 41%						
Leguminoase: Coronilla varia, Genista tinctoria, Ononis hircine, Ononis spinosa, Onobrychis vicifolia, Trifolium campestre, Trifolium repens, Medicago sativa - 6%						
Diverse plante: Dictamnus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris - 50%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Colchicum autumnale, Cirsium arvense, Urtica dioica, Stellaria graminea, Atropa Belladonna, Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias - 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 98%						
Încărcătura cu animale: 0,72 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,93 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Robinia pseudoacacia, Salix ssp., Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus caesius, Rosa canina - pe 7% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și cele 2 surse de apă.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea unui număr de 21 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	LA GORONI	-	25,50	Pășune		
ALTITUDINE: 433 m EXPOZIȚIE: N ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 42 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia - 5%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale - 50%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum - 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 0,76 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,87 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Salix ssp., Crataegus monogyna, Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rubus caesius, Rosa canina, Quercus petraea – pe 10% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 12 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	PODUL LUI FODOR	-	104,26	Pășune		
ALTITUDINE: 467 m EXPOZIȚIE: -NE ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: preluvosol tipic erodat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp , Cynosurus cristatus, Anthoxantum odoratum, Aspera spica venti, Nardus stricta, Holcus lanatus-43%						
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia, Stipa capillata-7%						
Diverse plante: Astragalus onobrychis, Linum flavum, Dictamnus albus, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Anthemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale -47%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Carduus ssp., Cirsium arvense, Urtica ssp., Ranunculus acer, Stellaria graminea, Equisetum arvense, Euphorbia cyparissias , Papaver roheas-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 0,76 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,95 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Malus sylvestris, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Salix ssp., Rosa canina - pe 10% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a) Fertilizare organic și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 18 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	VALEA VIILOR	-	72,78	Pășune		
ALTITUDINE: 357 m EXPOZIȚIE: -S ÎNCLINAȚIE: 30% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Lolium Perenne, Agrostis ssp., Nardus stricta, Holcus Lanatus, Anthoxanthum odoratum-50%						
Leguminoase: Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium ssp., Vicia ssp., Medicago ssp. – 6%						
Diverse plante: Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Dictamus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Centaurea cyanus, Arthemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris -41%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Stellaria graminea, Stellaria graminea, Atropa Belladonna, Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 0,73 UVM/(calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,92 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Malus sylvestris, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Crataegus monogyna, Salix ssp., Rosa canina, Prunus spinosa- pe 8% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a) Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 18 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform lung	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	DUPĂ DEAL	-	67,73	Pășune		
ALTITUDINE: 333 m EXPOZIȚIE: -E ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene, Holcus lanatus-42 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Medicago sativa, Trifolium ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Vicia ssp.-8%						
Diverse plante: Dictamnus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arthemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris -47%						
Plante dăunătoare și toxice: Caltha lathea, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum, Rumex acetostella, Cirsium arvense, Urtica dioica – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 0,72 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,92 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Crataegus monogyna, Salix ssp., Rosa canina, Prunus spinosa- pe 0,4% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 13 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform lung	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	ACASTĂI	-	65,65	Pășune		
ALTITUDINE: 341 m EXPOZIȚIE: - V ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: regosol eutric scheletic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Deschampsia caespitosa, Festuca ssp., Poa ssp, Setaria ssp, Agrostis ssp. Nardus stricta-47%						
Leguminoase: Trifolium campestre, Trifolium repens, Medicago sativa, Vicia craca, Ononis spinosa, Coronilla varia, Lotus corniculatus-6%						
Diverse plante: Capsella bursa pastoris, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia sp., Cicorium intibus, Anthoxantum odoratum, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Agropyron repens, Poa sp., Briza media, Dactylis glomerata, Cardus sp., Daucus carota, Artemis arvensis, Juncus, Eriogonum planum, Carex paniculata, Carex canescens, Potentilla erecta, Taraxacum officinalis, Rumex acetosella, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Veronica officinalis-44%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias, Papaver roeas, Conium maculatum, Echium vulgare, Carduus ssp. -3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 0,73 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,91 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa Canina, Rubus caesius- pe 0,4% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetației arbustive, tăierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor dăunătoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 12 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TUSICHERT	-	55,70	Pășune		
ALTITUDINE: 321 m EXPOZIȚIE: - V ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Deschampsia caespitosa, Apera spica venti, Setaria ssp, Agrostis ssp., Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –7%						
Diverse plante: Anthoxantum odoratum, Teraxacum officinale, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Festuca rubra, Agropyron repens, Poa ssp., Briza media, Dactylis glomerata, Campanula sp, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia ssp., Cicorium intibus, Cardus ssp., Rumex ssp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Juncus effuses, Urtica ssp, Mentha crispa, Nardus stricta, Carex ssp.-50%						
Plante dăunătoare și toxice: Hypericum perforatum, Ricinus communis, Euphorbia cyprisias, Ricinus communis, Lepidium ruderales, Carduus ssp.–3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 0,73 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,86 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Fagus sylvatica, Quercus petraea, Rubinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rosa Canina, Rubus caesius- 5,57% pășune împădurită (pentru care se propune trecerea pe viitor la categoria "Teren forestier" și care va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 11 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă, iar suprafața de 2,9 ha, unde consințența depășește 0,4, va fi trecută la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform lung	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	MĂGURA	-	32,45	Pășune		
ALTITUDINE: 518 m EXPOZIȚIE: - NV ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene, Holcus lanatus-40 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Medicago sativa, Trifolium ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Vicia ssp.– 10%						
Diverse plante: Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Dictamnus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris -48%						
Plante dăunătoare și toxice: Caltha lathea, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum, Rumex acetostella, Cirsium arvense, Urtica dioica – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 0,69 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 0,85 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Rubinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rosa Canina, Rubus caesius – pe 5 din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, tăierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 1	-	68,92	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 343 m EXPOZIȚIE: -S ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: -regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum ssp., Apera spica venti, Agrostis ssp., Lolium Perenne, Holcus lanatus- 39%						
Leguminoase: Trifolium ssp. ,Vicia ssp. ,Lotus corniculatus, Coronilla varia, Medicago ssp., Stipa capillata –8%						
Diverse plante: Astragalus onobrychis, Dictamus albus, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Thymus ssp., Capsella bursa pastoris - 50%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Caltha laeta, Adonis vernalis, Ricinus communis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Urtica ssp. –3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 0,92 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,09 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Rubinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rosa Canina, Fagus Sylvatica, Quercus petraea – 3,2% pășune împădurită (care pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/30/nu se aplica- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 10 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1,7 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintu Gherlîi	TRUP 2	-	62	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 390 m EXPOZIȚIE: V ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: regosol proxicalcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –5%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontodon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officinale - 52%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,00 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,21 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Salix L. Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Malus sylvestris, Fagus sylvatica, Quercus petraea – pe 10% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: îndepărtarea vegetatiei arbustive, tăierea arboretelor și scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare și toxice, culegerea pietrelor și resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 11 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintu Gherlii	TRUP 3	-	26,03	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 316 m EXPOZIȚIE: - S ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Deschampsia caespitosa, Apera spica venti, Setaria ssp, Agrostis ssp., Holcus lanatus-39%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –8%						
Diverse plante: Anthoxantum odoratum, Teraxacum officinale, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Festuca rubra, Agropyron repens, Poa ssp., Briza media, Dactylis glomerata, Campanula sp, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia ssp., Cicorium intibus, Cardus ssp., Rumex ssp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Juncus effuses, Urtica ssp, Mentha crispa, Nardus stricta, Carex ssp.-50%						
Plante dăunătoare și toxice: Hypericum perforatum, Ricinus communis, Euphorbia cyprisias, Ricinus communis, Lepidium ruderales, Carduus ssp.–3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,04 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,23 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplica- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 4	-	58,11	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 379 m EXPOZIȚIE: - S ÎNCLINAȚIE: 20% SOL:regosol eutric subscheletic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște:Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Deschampsia caespitosa, Festuca ssp., Poa ssp , Setaria ssp, Agrostis ssp.Nardus stricta-45 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Trifolium ssp ,Coronilla varia –5%						
Diverse plante: Capsella bursa pastoris, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia sp., Cicorium intibus, Anthoxantum odoratum, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Agropyron repens, Poa sp., Briza media, Dactylis glomerata,Cardus sp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Artemis arvensis, Juncus, Eringium planum, Carex panciflora, Carex canescens, Carex pilulifera, Carex rostrata, Potentilla erecta ,Taraxacum officinalis, Rumex acetosella, Festuca rubra, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Veronica officinalis-46%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Conim maculatum, Hypericum perforatum, Papaver rhoes – 4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,14 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,35 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Salix L. Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Malus sylvestris, Fagus sylvatica, Quercus petraea - 2,75% pășune împădurită (care pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra in amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare si toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 12 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1,6 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic"și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 5	-	37,40	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 284 m EXPOZIȚIE: -SE ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: -regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum ssp., Apera spica venti, Agrostis ssp., Lolium Perenne, Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp. ,Vicia ssp. ,Lotus corniculatus, Coronilla varia, Medicago ssp., Stipa capillata –7%						
Diverse plante: Astragalus onobrychis, Dictamus albus, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Thymus ssp., Capsella bursa pastoris - 50%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Caltha laeta, Adonis vernalis, Ricinus communis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Urtica ssp. –3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,19 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,42 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Malus sylvestris, Fagus sylvatica, Quercus petraea – 1,33 % din suprafață este împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 12 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 0,5 ha, iar suprafețele unde consinența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: undulată
Mintiu Gherlii	TRUP 6	-	45,08	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 271 m EXPOZIȚIE: - N ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Deschampsia caespitosa, Apera spica venti, Setaria ssp, Agrostis ssp., Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Anthoxantum odoratum, Teraxacum officinale, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Festuca rubra, Agropyron repens, Poa ssp., Briza media, Dactylis glomerata, Campanula sp, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia ssp., Cicorium intibus, Cardus ssp., Rumex ssp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Juncus effuses, Urtica ssp, Mentha crispa, Nardus stricta, Carex ssp.-51%						
Plante dăunătoare și toxice:Hypericum perforatum, Ricinus communis, Euphorbia cyprisias, Ricinus communis, Lepidium ruderales, Carduus ssp.–3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,14 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,32 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 9 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 7	-	113,25	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 273 m EXPOZIȚIE: -E ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: -eutricambosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum ssp., Apera spica venti, Agrostis ssp., Lolium Perenne, Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp. ,Vicia ssp. ,Lotus corniculatus, Coronilla varia, Medicago ssp., Stipa capillata –7%						
Diverse plante: Deschampsia caespitosa,Campanula ssp, Cicorium intibus, Astragalus onobrychis, Dictamus albus,Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis,Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp.,Taraxacum officinale, Thymus ssp.,Capsella bursa pastoris - 49%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Caltha laeta, Adonis vernalis, Ricinus communis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Urtica ssp. –4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,19 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,40 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Salix L. Rosa canina, Robinia pseudoacacia - pe 0,3% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursa de apă.						
Lucrări propuse: indepartarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor si scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare si toxice, culegerea pietrelor si resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a).Fertilizare organica și chimica (N.P.K- 60/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 16 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 8	-	31,72	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 352 m EXPOZIȚIE: N ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol stagnic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –5%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontodon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officinale -53%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,15 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,34 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Salix L. – pe 1,58% din suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse indepartarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor si scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare si toxice, culegerea pietrelor si resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/50- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 10 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 9	-	59,08	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 404 m EXPOZIȚIE: - NV ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște:Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Deschampsia caespitosa, Festuca ssp., Poa ssp , Setaria ssp, Agrostis ssp.Nardus stricta-44 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Trifolium ssp ,Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Capsella bursa pastoris, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia sp., Cichorium intibus, Anthoxantum odoratum, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Agropyron repens, Poa sp., Briza media, Dactylis glomerata,Cardus sp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Artemis arvensis, Juncus, Eriogonum planum, Carex paniciflora, Carex canescens, Carex pilulifera, Carex rostrata, Potentilla erecta ,Taraxacum officinalis, Rumex acetosella, Festuca rubra, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Veronica officinalis-47%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Conium maculatum, Hypericum perforatum, Papaver rhoes – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,15 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,35 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea a 14 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform lung	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 10	-	58,35	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 382 m EXPOZIȚIE: -N ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: eutricambosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene, Holcus lanatus-40 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Medicago sativa, Trifolium ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Vicia ssp.-10%						
Diverse plante: Dictamnus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris -47%						
Plante dăunătoare și toxice: Caltha lathea, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum, Rumex acetostella, Cirsium arvense, Urtica dioica – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,08 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,25 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 10 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 11	-	20,60	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 438 m EXPOZIȚIE: - E ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Deschampsia caespitosa, Apera spica venti, Setaria ssp, Agrostis ssp., Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –8%						
Diverse plante: Anthoxantum odoratum, Teraxacum officinale, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Festuca rubra, Agropyron repens, Poa ssp., Briza media, Dactylis glomerata, Campanula sp, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia ssp., Cicorium intibus, Cardus ssp., Rumex ssp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Juncus effuses, Urtica ssp, Mentha crispa, Nardus stricta, Carex ssp.-49%						
Plante dăunătoare și toxice: Hypericum perforatum, Ricinus communis, Euphorbia cyprisias, Ricinus communis, Lepidium ruderales, Carduus ssp.–3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,24 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,42UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 12	-	68,78	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 506 m EXPOZIȚIE: - NE ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic erodat moderat						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Deschampsia caespitosa, Apera spica venti, Setaria ssp, Agrostis ssp., Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Agropyron repens, Poa ssp., Briza media, Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum, Teraxacum officinale, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Festuca rubra, Campanula sp, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia ssp., Cicorium intibus, Cardus ssp., Rumex ssp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Juncus effuses, Urtica ssp, Mentha crispa, Nardus stricta, Carex ssp.-50%						
Plante dăunătoare și toxice: Hypericum perforatum, Ricinus communis, Euphorbia cyprisias, Ricinus communis, Lepidium ruderales, Carduus ssp.–4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,20 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,41 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Salix L., Crataegus monogyna, Fagus sylvatica – 6,1% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 11 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 4,2 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 13	-	68,78	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 392 m EXPOZIȚIE: - E ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: faeoziom clinogleic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște:Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Deschampsia caespitosa, Festuca ssp., Poa ssp , Setaria ssp, Agrostis ssp.Nardus stricta-44 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Trifolium ssp ,Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia sp., Cicorium intibus, Anthoxantum odoratum, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Agropyron repens, Poa sp., Briza media, Dactylis glomerata, Cardus sp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Capsella bursa pastoris, Arctium lappa, Convolvurus, Artemis arvensis, Juncus, Eringium planum, Carex panciflora, Carex canescens, Carex pilulifera, Carex rostrata, Potentilla erecta ,Taraxacum officinalis, Rumex acetosella, Festuca rubra, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Veronica officinalis-47%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Conim maculatum, Hypericum perforatum, Papaver rhoes – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,17 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,38 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiile, s-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 11 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	TRUP 14	-	64,25	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 420 m EXPOZIȚIE: -N ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Lolium Perenne, Agrostis ssp., Nardus stricta, Holcus Lanatus, Anthoxanthum odoratum-49%						
Leguminoase: Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium ssp., Vicia ssp., Medicago ssp. -6%						
Diverse plante: Dictamus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris -42%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Stellaria graminea, Stellaria graminea, Atropa Belladonna, Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,17 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,39 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica – 2,33% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 12 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1,5 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	TRUP 15	-	102,39	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 419 m EXPOZIȚIE: -N ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: -regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum ssp., Apera spica venti, Agrostis ssp., Lolium Perenne, Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp. ,Vicia ssp. ,Lotus corniculatus, Coronilla varia, Medicago ssp., Stipa capillata –8%						
Diverse plante: Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Thymus ssp., Astragalus onobrychis, Dictamnus albus, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemisia arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Capsella bursa pastoris - 47%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Caltha laeta, Adonis vernalis, Ricinus communis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Urtica ssp. –5%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,19 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,38 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Fagus sylvatica, Fagus sylvatica, Robinia pseudoacacia - 6,05% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 18 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 6,2 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	TRUP 16	-	99,37	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 366 m EXPOZIȚIE: -SV ÎNCLINAȚIE: 25% SOL: -preluposol stagnic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum ssp., Apera spica venti, Agrostis ssp., Lolium Perenne, Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp., Vicia ssp., Lotus corniculatus, Coronilla varia, Medicago ssp., Stipa capillata –7%						
Diverse plante: Dictamnus albus, Linum flavum, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemisia arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Thymus ssp., Capsella bursa pastoris, Astragalus onobrychis, - 48%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Caltha laeta, Adonis vernalis, Ricinus communis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Urtica ssp. –5%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,17 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,37 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea – 2,41% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 13 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 2,4 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	TRUP 17	-	109,75	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 368 m EXPOZIȚIE: S ÎNCLINAȚIE: 30% SOL: faeoziom clinogleic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officinale -49%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-5%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,09 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,28 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica - 4,1% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 16 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 4,5 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu GHERLII	TRUP 18	-	87,10	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 324 m EXPOZIȚIE: - E ÎNCLINAȚIE: 25% SOL: eutricambosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Deschampsia caespitosa, Apera spica venti, Setaria ssp, Agrostis ssp., Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp, Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –5%						
Diverse plante: Rumex acetosella, Festuca rubra, Anthoxantum odoratum, Teraxacum officinale, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Agropyron repens, Poa ssp., Briza media, Dactylis glomerata, Campanula sp, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Vicia ssp., Cicorium intibus, Cardus ssp., Rumex ssp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Juncus effuses, Urtica ssp, Mentha crispa, Nardus stricta, Carex ssp.-51%						
Plante dăunătoare și toxice:Hypericum perforatum, Ricinus communis, Euphorbia cyprisias, Ricinus communis, Lepidium ruderales, Carduus ssp.-4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,18 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,37 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 12 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant superior	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 19	-	63,40	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 298 m EXPOZIȚIE: - NV ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: regosol etric subscheletic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște:Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Deschampsia caespitosa, Festuca ssp., Poa ssp , Setaria ssp, Agrostis ssp.Nardus stricta-44 %						
Leguminoase: Medicago falcata, Trifolium ssp ,Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Lotus corniculatus, Vicia sp., Cicorium intibus, Anthoxantum odoratum, Cynosurum cristatus, Achillea millefolium, Medicago sativa, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Agropyron repens, Poa sp., Briza media, Dactylis glomerata,Cardus sp., Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Artemis arvensis, Juncus, Eriogonum planum, Carex panciflora, Carex canescens, Carex pilulifera, Carex rostrata, Potentilla erecta ,Taraxacum officinalis, Rumex acetosella, Festuca rubra, Urtica ssp, Mentha crisper, Prunella vulgaris, Veronica officinalis, Capsella bursa pastoris, Holcus lanatus-47%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euforbia cyparissias, Conim maculatum, Hypericum perforatum, Papaver rhoes – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,09 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,27 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 10 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 20	-	87,95	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 297 m EXPOZIȚIE: E ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: eutricambosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -50%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,17 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,36 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica - 3,41% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate-S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/50- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 11 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 3 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 21	-	62,50	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 300 m EXPOZIȚIE: V ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: regosol eutric subscheletic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 38 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –8%						
Diverse plante: Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale - 51%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias, Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,19 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,41 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 12 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	TRUP 22	-	71,68	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 314 m EXPOZIȚIE: -E ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Lolium Perenne, Agrostis ssp., Nardus stricta, Holcus Lanatus, Anthoxanthum odoratum-49%						
Leguminoase: Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium ssp., Vicia ssp., Medicago ssp. -6%						
Diverse plante: Dictamus albus, Astragalus onobrychis, Descampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris, Dictamus albus, Astragalus onobrychis -41%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Stellaria graminea, Stellaria graminea, Atropa Belladonna, Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias-4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,14 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,33 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica-1,11% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate-S-au curățat drumurile pastorale și sursa de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 10 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 0,8 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	TRUP 23	-	41,50	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 409 m EXPOZIȚIE: N ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol stagnic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –7%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -50%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,20 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,41 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica – 4,57% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate-S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/50- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 10 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1,9 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	Trup 24	-	8,50	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 354 m EXPOZIȚIE: V ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: regosol eutric subscheletic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 42 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -50%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,14 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,31 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Rubus caesius, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica - 8,23% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate-S-au curățat drumurile pastorale și sursa de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 6 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 0,7 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 25	-	26,75	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 364 m EXPOZIȚIE: -NE ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol stagnic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp , Cynosurus cristatus, Anthoxantum odoratum, Aspera spica venti, Nardus stricta, Holcus lanatus-42%						
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia, Stipa capillata-8%						
Diverse plante: Cicorium intibus, Galinsoga parviflora,Daucus carota, Dictamus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris,Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Centaurea cyanus, Anthemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp.,Taraxacum officinale -48%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Carduus ssp.,Cirsium arvense, Urtica ssp.,Ranunculus acer, Stellaria graminea, Equisetum arvense,Euphorbia cyparissias , Papaver roheas-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,23 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,42 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Rubus caesius, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica - 5,23% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate-S-au curățat drumurile pastorale și sursa de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare si toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 8 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1,4 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic"și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 26	-	84,20	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 359 m EXPOZIȚIE: E ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: preluvosol stagnic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –9%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -48%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,13 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,31 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Fagus sylvatica – 11,87% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate-S-au curățat drumurile pastorale și sursa de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/40/40 - kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 14 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 27	-	10,73	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 401 m EXPOZIȚIE: S ÎNCLINAȚIE: 25% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 42 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officinale -50%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,18 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,39 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Malus sylvestris, Crataegus monogyna, Salix L. – pe 0,53% suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: indepartarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor si scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare si toxice, culegerea pietrelor si resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organica și chimica (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 28	-	30,15	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 420 m EXPOZIȚIE: -S ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp , Cynosurus cristatus, Anthoxantum odoratum, Aspera spica venti, Nardus stricta, Holcus lanatus-42%						
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia, Stipa capillata-8%						
Diverse plante: Dictamus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Anthemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale -48%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Carduus ssp., Cirsium arvense, Urtica ssp., Ranunculus acer, Stellaria graminea, Equisetum arvense, Euphorbia cyparissias , Papaver roheas-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,13 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,36 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Robinia pseudoacacia, Crataegus monogyna, Salix L. – 11,6% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare si toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 10 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 3,5 ha ,iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic"și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 29	-	12,24	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 401 m EXPOZIȚIE: -S ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: regosol calcaric						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp , Cynosurus cristatus, Anthoxantum odoratum, Aspera spica venti, Nardus stricta, Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia, Stipa capillata-8%						
Diverse plante: Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Dictamus albus, Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Anthemis arvensis -50%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Carduus ssp., Cirsium arvense, Urtica ssp., Ranunculus acer, Stellaria graminea, Equisetum arvense, Euphorbia cyparissias , Papaver roheas-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,12 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,31 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Pășune curată, fără vegetație arbustivă						
Lucrări executate- S-au îndepărtat plantele toxice, s-au nivelat mușuroaiele, s-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare și toxice, nivelarea mușuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/60/nu se aplica- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: undulată
Mintiu Gherlii	Trup 30	-	81,83	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 450 m EXPOZIȚIE: E ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: luvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 38 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –10%						
Diverse plante: Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -49%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,14 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,35 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Robinia pseudoacacia, Crataegus monogyna, Salix L., Quercus petraea, Fagus sylvatica – 9,4% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică N.P.K- 60/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 14 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 7,7 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 31	-	69,87	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 443 m EXPOZIȚIE: E ÎNCLINAȚIE: 10% SOL: luvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –8%						
Diverse plante: Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -49%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias, Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,15 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,37 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Robinia pseudoacacia, Crataegus monogyna, Salix L., Quercus petraea, Fagus sylvatica – 2,28% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 10 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 1,6 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 32	-	14,35	Mixtă (pășune+fâneață)		
ALTITUDINE: 517 m EXPOZIȚIE: V ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: preluvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perene - 40 %						
Leguminoase: Trifolium ssp. , Vicia ssp. , Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Plantago lanceolata, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officiale -52%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias , Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-2%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,13 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,33 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Robinia pseudoacacia – pe 12% suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: indepartarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor si scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare si toxice, culegerea pietrelor si resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organica și chimica (N.P.K- 60/80/nu se aplică- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	Trup 33	-	22,60	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 510 m EXPOZIȚIE: -V ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: luvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp , Cynosurus cristatus, Anthoxantum odoratum, Aspera spica venti, Nardus stricta, Holcus lanatus-36%						
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp., Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Lathyrus pratensis, Coronilla varia, Stipa capillata-8%						
Diverse plante:Astragalus onobrychis, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris,Plantago lanceolata, Deschampsia caespitosa, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora,Daucus carota, Centaurea cyanus, Anthemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp.,Taraxacum officinale -53%						
Plante dăunătoare și toxice: Colchicum autumnale, Carduus ssp.,Cirsium arvense, Urtica ssp.,Ranunculus acer, Stellaria graminea, Equisetum arvense,Euphorbia cyparissias , Papaver roheas-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 99%						
Încărcătura cu animale: 1,13 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,31 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Fagus sylvatica –pe 10% suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: indepartarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor si scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare si toxice, culegerea pietrelor si resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/80/40- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 9 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant neuniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 34	-	81,84	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 320 m EXPOZIȚIE: V ÎNCLINAȚIE: 15% SOL: Iuvosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum pratense, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perenne - 42 %						
Leguminoase: Trifolium ssp., Vicia ssp., Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Lathyrus pratensis, Coronilla varia –6%						
Diverse plante: Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Leontoclon autumnale, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Galium verum, Potentilla argentea, Potentilla arenaria, Asperula vulgaris, Salvia nemorosa, Chrysanthemum leucanthemum, Campanula patula, Salvia nemorosa, Matricaria ssp., Taraxacum officinale -49%						
Plante dăunătoare și toxice: Ranunculus acer, Euphorbia cyparissias, Conium maculatum, Caltha laeta, Colchicum autumnale, Hypericum perforatum-3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,15 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,38 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus spinosa, Rosa canina, Fagus sylvatica, Quercus petraea – 6,1% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 60/70/40- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 12 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 5 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						



UAT	TRUP DE PAIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform lung	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlii	Trup 35	-	31,92	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 430 m EXPOZIȚIE: - V ÎNCLINAȚIE: 20% SOL: -livosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Cynosurus cristatus, Festuca ssp., Lolium perenne, Poa ssp. ,Nardus stricta, Agropyron ssp., Setaria ssp., Holcus lanatus, Agrostis ssp. -43 %						
Leguminoase: Genista sagittalis, Trifolium ssp. ,Vicia ssp., Lotus corniculatus, Genista tinctoria, Medicago sativa –7%						
Diverse plante:Vicia craca, Carum carvi, Filipendula hexapetala, Geranium pratense, Cardaria draba, Daucus carota,Cynosurus cristatus, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Agropyron repens, Briza media, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora,Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Artemis arvensis, Juncus, Mentha crispa,Taraxacum officinale, Capsella bursa pastoris- 47%						
Plante dăunătoare și toxice: Lepidium ruderales,Euphorbia cyparissias , Papaver roheas,Conium maculatum – 3%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,17 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,41 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus caesius – pe 5% suprafață (pe viitor se va curăța).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale și sursele de apă.						
Lucrări propuse: indepartarea vegetatiei arbustive, taierea arboretelor si scoaterea cioatelor, combaterea plantelor daunatoare si toxice, culegerea pietrelor si resturilor lemnoase, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/70/40- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 8 borne din beton.						



UAT	TRUP DE PAJIȘTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAȚA (ha)	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	UNITATE DE RELIEF : versant uniform scurt	CONFIGURAȚIA: ondulată
Mintiu Gherlîi	Trup 36	-	80,03	Mixtă (pășune+fâneată)		
ALTITUDINE: 496 m EXPOZIȚIE: -V ÎNCLINAȚIE: 25% SOL: -prelivosol tipic						
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajiște: Festuca ssp./Poa ssp.						
Graminee: Festuca ssp., Poa ssp., Phleum ssp., Apera spica venti, Agrostis ssp., Lolium Perenne, Holcus lanatus-40%						
Leguminoase: Trifolium ssp. ,Vicia ssp. ,Lotus corniculatus, Coronilla varia, Medicago ssp., Stipa capillata –8%						
Diverse plante: Deschampsia caespitosa, Campanula ssp, Cicorium intibus, Astragalus onobrychis, Dictamus albus, Linum flavum, Prunella laciniata , Salvia pratensis, Achillea millefolium, Sanquisorba officinalis, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Galinsoga parviflora, Daucus carota, Centaurea cyanus, Artemis arvensis, Juncus effusus, Mentha crispa, Carex ssp., Potentilla ssp., Taraxacum officinale, Thymus ssp., Capsella bursa pastoris - 48%						
Plante dăunătoare și toxice: Conium maculatum, Caltha laeta, Adonis vernalis, Ricinus communis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Urtica ssp. –4%						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei – 98%						
Încărcătura cu animale: 1,17 UVM/ha (calculată cu producția de iarbă din anul elaborării AP). În urma aplicării măsurilor propuse încărcătura de animale va putea crește până la 1,43 UVM/ha.						
Vegetația lemnoasă: Prunus spinosa, Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Faus sylvatica, Quercus robur – 2,49% este suprafață împădurită (pe viitor va fi trecută la categoria "Teren forestier" și va intra în amenajamentul silvic).						
Lucrări executate- S-au curățat drumurile pastorale.						
Lucrări propuse: combaterea plantelor daunatoare și toxice, nivelarea musuroaielor (vezi tabel 6.1.a). Fertilizare organică și chimică (N.P.K- 70/70/nu se aplica- kg/ha). Delimitarea trupului prin amplasarea 14 borne din beton. Acolo unde există pășune împădurită se va defrișa vegetația lemnoasă pe suprafața de 2 ha, iar suprafețele unde consințența depășește 0,4 vor fi trecute la categoria de folosință "teren silvic" și se vor introduce în amenajament silvic.						

